

CSArn
QUESTIONARIO T1

1.	Quale delle seguenti condizioni è atipica nel paziente acromegalico?
A.	Sindrome da intrappolamento del nervo mediano al polso o del nervo ulnare
B.	Ipoglicemia
C.	Iperprolattinemia
D.	Ipertensione arteriosa
2.	Quale è la causa più comune di embolia arteriosa?
A.	La presenza di un aneurisma aortico
B.	La fibrillazione atriale
C.	L'assunzione di farmaci chemioterapici
D.	Nessuna delle precedenti
3.	Quali tra questi segni NON è presente nell'embolia polmonare massiva
A.	Turgore delle giugulari
B.	Edema a mantellina
C.	Dolore di tipo anginoso
D.	Dispnea severa e cianosi
4.	La sequenza trifasica caratterizzata da pallore delle dita delle mani seguito da colorito bluastro e successivo arrossamento della cute come viene definita?
A.	Fenomeno di Raynaud
B.	Livedo Reticularis
C.	Eritromelalgia
D.	Vasculite
5.	In un giovane che presenta senso di costrizione al torace associato a tosse non produttiva, con SpO2 96% in aria ambiente, tachipnea, tachicardia, fischi e sibili su tutto l'ambito toracico, quale tra i seguenti provvedimenti è quello più indicato?
A.	Somministrazione di antistaminico per i.v.
B.	Somministrazione di antistaminico per os
C.	Somministrazione per via intramuscolare di aminofilline
D.	Somministrazione di salbutamolo per via inalatoria
6.	In un soggetto cardiopatico, nel sospetto di un edema polmonare cardiogeno (severa dispnea con tachipnea, PA 140/90 mmHg. rantoli e sibili all'auscultazione del torace) nell'intraprendere subito la terapia farmacologica, quale dei seguenti provvedimenti NON è utile ?
A.	Furosemide
B.	Atenololo
C.	Nitroglicerina
D.	Ossigenoterapia
7.	Le broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO) comprendono diverse affezioni caratterizzate dalla presenza di:
A.	Bronchite e asma
B.	Asma e enfisema
C.	Bronchite, asma e enfisema e polmonite batterica
D.	Bronchite, asma e enfisema

CSArn
QUESTIONARIO T1

8.	Cianosi diffusa di origine ematologica si può osservare in una di queste condizioni:
A.	Sarcoidosi
B.	Enfisema polmonare
C.	Malattia di Pickwick
D.	Policitemia vera

9.	Lo pneumotorace NON è in genere associato a:
A.	Manovra invasive di diagnostica pleuropolmonare
B.	Rottura di bolle enfisematose polmonari
C.	Rottura di blebs subpleuriche polmonari
D.	Lacerazione esofagea non iatrogena

10.	Quale dei seguenti fattori predispone all'insorgenza di una neoplasia del colon retto?
A.	Il fumo di sigaretta
B.	Il diabete
C.	L'alcolismo
D.	La familiarità

11.	La complicanza più grave di una TVP (Trombosi Venosa Profonda) è:
A.	Un infarto del miocardio
B.	Un'alterazione della sensibilità dell'arto colpito
C.	Un'embolia polmonare
D.	Una discromia cutanea dell'arto colpito

12.	In un quadro clinico di ileo meccanico in soggetto di età avanzata, quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?
A.	Diverticolo perforato
B.	Appendicite
C.	Calcolosi della colecisti
D.	Carcinoma del colon

13.	In caso di dispepsia cronica resistente alla terapia, quale è tra le seguenti l'indagine diagnostica iniziale più appropriata?
A.	TC addome pelvi
B.	Clisma opaco a doppio contrasto
C.	RX Digerente e RM addome
D.	Esofagogastroduodenoscopia con eventuale biopsia

14.	Come si chiama l'associazione dei tre segni clinici dolore addominale associato a febbre con brivido ed ittero?
A.	Triade di Charcot
B.	Triade di Calot
C.	Triade di Reynolds
D.	Triade di Virchow

15.	Quale delle seguenti è la più frequente lesione neoplastica dello scheletro?
A.	Metastasi ossea
B.	Condrosarcoma
C.	Osteosarcoma
D.	Osteoblastoma

CSArn
QUESTIONARIO T1

16.	In caso di valori di PSA elevati ed esame obiettivo con esplorazione rettale dubbio per neoplasia prostatica, quale iter diagnostico è considerato attualmente più appropriato tra i seguenti:
A.	Biopsia prostatica, TC addome pelvi senza MdC
B.	Ecografia prostatica transrettale, TC addome pelvi
C.	PET/TC con 18F-FDG
D.	RM multiparametrica della prostata, biopsia prostatica, scintigrafia ossea

17.	La reazione alla tubercolina:
A.	E' dovuta all'attivazione dei linfociti B
B.	E' dovuta all'attivazione delle cellule NK
C.	E' una reazione di ipersensibilità ritardata
D.	E' una reazione di ipersensibilità immediata

18.	L'isolamento ha lo scopo di:
A.	Individuare focolai di malattie infettive
B.	Separare i contatti dalla collettività
C.	Separare l'individuo affetto da malattie infettive e contagiose dalla collettività
D.	Separare i portatori dalla collettività

19.	L'agente etiologico della parotite epidemica è un:
A.	Adenovirus
B.	Paramixovirus
C.	Arbovirus
D.	Togavirus

20.	Un vaccino costituisce una forma di immunizzazione:
A.	Passiva artificiale
B.	Attiva naturale
C.	Passiva naturale
D.	Attiva artificiale

21.	Quale tra le seguenti eziologie di meningite richiede l'istituzione di una chemiopprofilassi tra i contatti stretti del caso indice?
A.	Listeria monocytogenes
B.	Mycobacterium tuberculosis
C.	Neisseria meningitidis
D.	Streptococcus pneumoniae

22.	Quale tra i seguenti fattori è fondamentale per poter intraprendere una campagna di screening?
A.	Basso costo del test
B.	Elevata sensibilità del test
C.	Elevato valore predittivo del test
D.	Possibilità di intervenire efficacemente sulla malattia in fase precoce

23.	Le zanzare del genere <i>Anopheles</i> risultano vettori per la trasmissione di quale delle seguenti malattie:
A.	Dengue
B.	Chikungunya
C.	Malaria
D.	Febbre gialla

CSArn
QUESTIONARIO T1

24. Possono essere corpi contundenti:	
A.	Gli oggetti rigidi adoperati occasionalmente per ledere
B.	Gli strumenti di offesa e di difesa personale non da punta o taglio
C.	I mezzi di offesa e difesa naturali dell'uomo e degli animali
D.	Tutte le precedenti

25. La copia della ricetta di sostanze stupefacenti:	
A.	Va conservata per un anno
B.	Va conservata per due anni
C.	Va conservata per cinque anni
D.	Non è necessario venga conservata

26. Ai sensi della legge 578/1993, la realtà della morte è definita da:	
A.	Cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo
B.	Cessazione irreversibile delle funzioni degli emisferi encefalici
C.	Cessazione irreversibile delle funzioni del tronco encefalico
D.	Cessazione irreversibile delle delle funzioni del cervelletto

27. Tutte le seguenti sono prestazioni erogate dall'INAIL, tranne una:	
A.	Fornitura degli apparecchi di protesi e cure mediche e chirurgiche
B.	Rendita ai superstiti
C.	Indennità mensile di frequenza
D.	Indennità giornaliera per inabilità temporanea

28. Quali sono i requisiti medico-legali della malattia professionale?	
A.	La malattia deve determinare almeno quaranta giorni di inabilità temporanea al lavoro
B.	La malattia deve essersi manifestata dopo una esposizione allo specifico rischio professionale di almeno un anno
C.	La malattia deve dipendere dall'esposizione prolungata del lavoratore a sostanza nociva presente nell'attività lavorativa e deve rientrare in apposita lista o esserne dimostrata la causa lavorativa
D.	La malattia deriva da un'esposizione allo specifico rischio concentrata nel tempo

29. Nell'intossicazione da CO le ipostasi sono classicamente definite	
A.	Viola
B.	Verdastre
C.	Brune
D.	Rosso ciliegia

30. La capacità di agire:	
A.	Si acquisisce alla nascita
B.	Si perde negli stati d'incoscienza
C.	Si acquisisce alla maggior età
D.	Una volta acquisita non viene mai persa

Commissione Esaminatrice

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 29 Ufficiali nei ruoli normali dei corpi dell'Aeronautica, di cui 4 (quattro) Tenenti nel Corpo Sanitario Aeronautico (anno 2024), pubblicato sul portale unico del reclutamento, inPA, e sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

SECONDA PROVA SCRITTA

ELABORATO 1 (E1)

- 1. IL DOLORE TORACICO**
- 2. L'ADDOME ACUTO**
- 3. I LIVELLI DI PREVENZIONE (PRIMARIA, SECONDARIA E TERZIARIA).
DEFINIZIONE, OBIETTIVI ED ESEMPI PRATICI**
- 4. IL NESSO DI CAUSALITA'**